


**XXVII OLIMPIADA FIZYCZNA(1977/1978). Stopień I, zadanie teoretyczne – T5.****Źródło:** Fizyka w szkole nr 6, 1978**Autor:** Waldemar Gorzkowski, Andrzej Kotlicki**Nazwa zadania:** Promień świetlny w kuli**Działy:** Optyka**Słowa kluczowe:** kula, promień świetlny, współczynnik załamania światła na kuli**Zadanie teoretyczne- T5, zawody I stopnia, XXVII OF.**


Dana jest przezroczysta kula o promieniu  $R$ . Współczynnik załamania światła na tej kuli zależy od odległości  $r$  od środka według wzoru

$$n(r) = \frac{R+a}{r+a}; \quad a > 0.$$

Na kulę pod kątem  $\alpha$  (rys.1) pada promień świetlny. Wyznacz najmniejszą odległość  $d$  tego promienia od środka kuli



Rys. 1



Rys.2

**Rozwiązanie**

Najpierw należy udowodnić że:

$$n(r)r \sin \beta(r) = \text{const.},$$

gdzie  $\beta(r)$  oznacza kąt załamania promienia na powierzchni kulistej o promieniu  $r$  współśrodkowej z badaną kulą.

Rozpatrzmy układ cienkich warstw sferycznych – rysunek 2. Z twierdzenia sinusów:

$$\frac{\sin \beta_1}{r_2} = \frac{\sin(\pi - \alpha_2)}{r_1} = \frac{\sin \alpha_2}{r_1}$$

$$\frac{\sin \alpha_2}{\sin \beta_2} = \frac{n(r_2)}{n(r_1)}$$

Zatem

$$n(r_2) \sin \beta_2 = n(r_1) \sin \alpha_2 = n(r_1) \frac{r_1}{r_2 \sin \beta_1}$$

Stąd ogólnie

$$n(r)r \sin \beta(r) = \text{const.}$$

W szczególności biorąc pod uwagę powierzchnię kuli i punkt największego zbliżenia promienia, otrzymujemy

$$n(d)d \sin \beta(d) = n(R)R \sin \beta(R).$$

Ale

$$\beta(d) = 90^\circ, \text{ ( tj. } \sin \beta(d) = 1 \text{ )}$$

$$n(R) = 1,$$

$$\sin \beta(R) = \sin \alpha,$$

wobec tego

$$(R + a)d = d(R \sin \alpha) + a(R \sin \alpha),$$

$$d = \frac{aR \sin \alpha}{a + R(1 - \sin \alpha)}.$$

---

Zadanie powyższe wypadło dość słabo, mimo że podobnego typu zadania były kilkakrotnie reprezentowane na zawodach.